



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية  
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: 2023

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي صندوق  $U_1$  على 5 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 1، 2، 3 ويحتوي صندوق  $U_2$  على 4 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 2، 2 (كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس).  
نختار عشوائيا أحد الصندوقين ونسحب منه عشوائيا كريتين في آن واحد.

(1) نعتبر الحوادث:  $A$  " سحب كريتين تحملان رقمين فرديين " ،  $B$  " سحب كريتين تحملان رقمين زوجيين "  $C$  " سحب كريتين إحداهما تحمل رقما فرديا والأخرى تحمل رقما زوجيا " (أ) أنجز الشجرة التي تُنمذج هذه التجربة.

(ب) بيّن أنّ  $P(A) = \frac{23}{60}$  و  $P(B) = \frac{1}{12}$  ثمّ احسب  $P(C)$

(2) نفرغ محتوى الصندوقين  $U_1$  و  $U_2$  في صندوق جديد  $U_3$  ثمّ نسحب منه عشوائيا كريتين في آن واحد.  $X$  المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين جُداء الرقمين المسجلين عليهما.

(أ) برّر أنّ مجموعة قيم المتغيّر العشوائي  $X$  هي  $\{1; 2; 3; 4; 6\}$

(ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي  $X$  ثمّ احسب أمله الرياضي  $E(X)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

أجب بصحيح أو خاطئ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية:

(1) حلّ المعادلة التفاضلية  $y' = 2y + 6$  الذي يحقّق  $y(\ln 2) = 25$  هو الدالة  $h$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $h(x) = 7e^{2x} - 3$

(2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \ln(e^x - 1)] = +\infty$

(3) القيمة المتوسطة للدالة  $x \mapsto x(x^2 + 1)^2$  على المجال  $[0; 2]$  هي 31

(4)  $(v_n)$  المتتالية المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  $v_n = \int_n^{n+1} e^{-x+3} dx$

من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ،  $v_0 + v_1 + \dots + v_n = e^3 - e^{-n+2}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

$(u_n)$  المتتالية المعرفة بـ:  $u_0 = \frac{1}{2}$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$ ،  $u_{n+1} = -1 + \frac{2}{2 - u_n}$

(1) أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$ ،  $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$



(ب) بيّن أنّ المتتالية  $(u_n)$  متناقصة تماما.

(2) نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$  ،  $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$


(أ) أثبت أنّ المتتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها 2 ثم اكتب عبارة  $v_n$  بدلالة  $n$

(ب) استنتج أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$  ،  $u_n = \frac{1}{2^n + 1}$  ثم احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(3) نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$  ،  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$  و  $T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}$

احسب  $S_n$  بدلالة  $n$  ثم بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$  ،  $T_n = 2^{n+1} + n$

التمرين الرابع: (07 نقاط)



(I)  $(\Gamma)$  التمثيل البياني للدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $x \mapsto (2x-1)e^{2x}$

و  $(D)$  المستقيم ذو المعادلة  $y = 1$  ،  $\alpha$  هي فاصلة نقطة

تقاطع  $(\Gamma)$  و  $(D)$  ( لاحظ الشكل المقابل )

(1) بقراءة بيانية ، حدّد وضعية  $(\Gamma)$  بالنسبة إلى  $(D)$

(2)  $g(x) = (2x-1)e^{2x} - 1$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:

استنتج حسب قيم  $x$  إشارة  $g(x)$  ثم تحقق أنّ:  $0,6 < \alpha < 0,7$

(II)  $f(x) = (x-1)(e^{2x} - 1)$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:

$(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  (وحدة الطول  $2\text{ cm}$ )

(1) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(2) (أ) بيّن أنّ المستقيم  $(\Delta)$  ذا المعادلة  $y = -x + 1$  مقارب مائل لـ  $(C_f)$  عند  $-\infty$

(ب) ادرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(\Delta)$

(3) (أ) بيّن أنّه: من أجل كلّ عدد حقيقي  $x$  ،  $f'(x) = g(x)$

(ب) استنتج أنّ  $f$  متناقصة تماما على  $]-\infty; \alpha]$  و متزايدة تماما على  $[\alpha; +\infty[$  ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ج) بيّن أنّ  $(C_f)$  يقبل مماسا  $(T)$  موازيا لـ  $(\Delta)$  ، يُطلب تعيين معادلة له.

(4) (أ) عيّن فواصل نقط تقاطع  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل.

(ب) ارسم  $(\Delta)$  ،  $(T)$  و  $(C_f)$  ( نأخذ :  $f(1,4) = 6,2$  و  $f(\alpha) = -0,9$  )

(ج) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  ، عدد حلول المعادلة  $f(x) = -x + m$

(5) (أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أنّ:  $\int_0^{\frac{1}{2}} (x-1)e^{2x} dx = \frac{3-2e}{4}$

(ب) استنتج، بالسنتيمتر المربع، مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحني  $(C_f)$  والمستقيمت التي معادلاتها:

$x=0$  ،  $x = \frac{1}{2}$  و  $y = -x + 1$



### الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، موزعة كما يلي: 3 كريات بيضاء مرقمة بـ: 1، 1، 2، 3 كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 2، 2، 2، 4 كريات خضراء مرقمة بـ: 1، 2، 2، 2، نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس ونعتبر الحوادث  $A$ ،  $B$ ،  $C$  الآتية:  
"  $A$  الحصول على كرتين من نفس اللون " ، "  $B$  الحصول على كرية خضراء على الأقل " "  $C$  الحصول على كرتين تحملان رقمين زوجيين "

(1) أ) بيّن أنّ احتمال الحدث  $A$  يساوي  $\frac{4}{15}$  وأنّ احتمال الحدث  $B$  يساوي  $\frac{2}{3}$

ب) احسب الاحتمالين  $P(C)$  و  $P(A \cap C)$ . هل الحدثان  $A$  و  $C$  مستقلان؟

ج) استنتج احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون علما أنّهما تحملان رقمين زوجيين.

(2) نعتبر المتغير العشوائي  $X$  الذي يرفق بكل عملية سحب لكرتين مجموع الرقمين المسجلين عليهما.

أ) برّر أنّ مجموعة قيم المتغير العشوائي  $X$  هي  $\{2; 3; 4\}$

ب) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي  $X$  ثمّ احسب أمله الرياضياتي  $E(X)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الآتية مع التبرير.

(1) حلا المعادلة  $8z^2 - 4z + 1 = 0$  ذات المجهول  $z$  في  $\mathbb{C}$  هما:

أ)  $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$  و  $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$  ب)  $-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$  و  $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$  ج)  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$  و  $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$

(2) الشكل الجبري للعدد المركب  $\frac{1 + \sqrt{3} + i}{1 - i}$  هو:

أ)  $\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left( \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)$  ب)  $\frac{\sqrt{3}}{2} - i \left( \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)$  ج)  $\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left( \frac{-2 + \sqrt{3}}{2} \right)$

(3) الجذران التربيعيان للعدد المركب  $-8 + 6i$  هما:

أ)  $1 + 3i$  و  $-1 - 3i$  ب)  $1 + 3i$  و  $1 - 3i$  ج)  $3 + i$  و  $-3 - i$

(4) الشكل المثلثي للعدد المركب  $\frac{1 + i}{\sqrt{3} - i}$  هو:

أ)  $\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$  ب)  $\frac{\sqrt{2}}{2} \left( \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$  ج)  $\frac{\sqrt{2}}{2} \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

$(u_n)$  المتتالية العددية المعرفة بـ:  $u_0 = 0$  ومن أجل كلّ عدد طبيعي  $n$ ،  $u_{n+1} = \frac{4}{5}u_n + 1$

(1) أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$ ،  $u_n < 5$

ب) بيّن أنّ  $(u_n)$  متزايدة تماما.



(2) نضع: من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ،  $v_n = u_n - 5$

(أ) أثبت أن المتتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $\frac{4}{5}$ ، يطلب تعيين حدّها الأول  $v_0$

(ب) اكتب عبارة  $v_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ،  $u_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$

(ج) احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(3) نضع: من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ،  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$  و  $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

احسب  $S_n$  بدلالة  $n$  ثم بين أنّه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ،  $T_n = 5n - 20\left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

$f$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  ب:  $f(x) = ((\ln x)^2 - 3) \ln x$

$(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) (أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  ثم فسّر النتيجة هندسياً.

(ب) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) (أ) بين أنّه: من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$ ،  $f'(x) = \frac{3(-1 + \ln x)(1 + \ln x)}{x}$

(ب) حلّ في المجال  $]0; +\infty[$  المتراجحة ذات المجهول  $x$ :  $(-1 + \ln x)(1 + \ln x) > 0$

(ج) استنتج أنّ الدالة  $f$  متزايدة تماماً على كلّ من المجالين  $]0; e^{-1}[$  و  $]e; +\infty[$  ومتناقصة تماماً على

المجال  $[e^{-1}; e]$  ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(3) (أ) عيّن معادلة لـ  $(T)$  مماس  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 1

(ب) عيّن فواصل نقط تقاطع  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل.

(ج) ارسم  $(T)$  و  $(C_f)$  على المجال  $]0; e^2]$

(4)  $F$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  ب:  $F(x) = x((\ln x)^3 - 3(\ln x)^2 + 3\ln x - 3)$

(أ) تحقق أنّ  $F$  دالة أصلية للدالة  $f$  على المجال  $]0; +\infty[$

(ب) احسب مساحة الحيّز المستوي المحدّد بالمنحني  $(C_f)$  وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما:

$$x = e \text{ و } x = 1$$

(5)  $h$  الدالة المعرفة على  $]0; +\infty[$  ب:  $h(x) = ((\ln x)^2 - 3)|\ln x|$  و  $(C_h)$  تمثيلها البياني في المعلم السابق.

اشرح كيف يمكن رسم  $(C_h)$  انطلاقاً من  $(C_f)$  ثم ارسمه على المجال  $]0; e^2]$