

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 11 كرة متماثلة لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي: كرتان بيضاوان مرقمتان بـ: 1 ، 3 وأربع كرات حمراء مرقمة بـ: 0 ، 1 ، 1 ، 3 وخمس كرات خضراء مرقمة بـ: 0 ، 1 ، 1 ، 3 ، 4 (I) نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الكيس ونعتبر الحوادث الآتية:

" الحصول على 3 كرات من نفس اللون " : A ، " الحصول على 3 كرات جُداء أرقامها عدد فردي "

" الحصول على 3 كرات جُداء أرقامها عدد زوجي " : C

(1) أ) احسب $P(A)$ احتمال الحادثة A و بين أن: $P(B) = \frac{56}{165}$ ثم استنتج $P(C)$

ب) احسب الاحتمال الشرطي $P_A(B)$

(2) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات، عدد الكرات التي تحمل رقما زوجيا.

أ) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

ب) احسب احتمال الحادثة $(X > 1)$

(II) نسحب الآن من الكيس عشوائيا 3 كرات على التوالي وبدون إرجاع.

- احسب احتمال الحادثة D : " الحصول على 3 كرات جُداء أرقامها معدوم "

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(I) حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة ذات المجهول z الآتية:

$$(z - 1 + 2\sqrt{3})[z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 5 - 2\sqrt{3}] = 0$$

(II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(0; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B و C التي لاحقاتها على الترتيب z_A ، z_B و z_C حيث: $z_A = 1 - \sqrt{3} + i$ ، $z_B = 1 - 2\sqrt{3}$ و $z_C = \bar{z}_A$

(1) اكتب كلاً من $z_A - 1$ ، $z_C - 1$ و z_B على الشكل المثلثي.

(2) جد لاحقة النقطة D مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$

(3) بين أن الرباعي $ABCD$ معين.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

$$(u_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة بـ: } u_0 = 0 \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n, u_{n+1} = \frac{4 - u_n}{2 + u_n}$$

(1) احسب الحدود u_1, u_2, u_3 ثم برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي $n, 0 \leq u_n \leq 2$

$$(2) (v_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ: } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 4}$$

(أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{2}{3}$ ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n

$$(ب) بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي $n, u_n = \frac{5}{1 - v_n} - 4$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$$

(3) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع:

$$S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2024} \quad \text{و} \quad T_n = \frac{1}{4 + u_n} + \frac{1}{4 + u_{n+1}} + \dots + \frac{1}{4 + u_{n+2024}}$$

- احسب S_n بدلالة n ثم استنتج T_n بدلالة n

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) يُمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = x e^{-x+1} - 2$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	$g(1)$	-2

- احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$

(II) f الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = -2x + 3 - x e^{-x+1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (وحدة الطول 2 cm).

(1) (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 3$ مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $+\infty$

ثم ادرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ)

(2) (أ) بين أنه: من أجل كل عدد حقيقي $x, f'(x) = g(x) - e^{-x+1}$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(4) (أ) ارسم (Δ) ، (T) و (C_f)

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -2x + m$ حلين مختلفين.

(5) (أ) باستعمال الكاملة بالتجزئة، بين أن: $\int_0^1 x e^{-x+1} dx = e - 2$

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع \mathcal{A} مساحة الحيز المستوي المحدّد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين

معادلتاهما: $x = 0$ و $x = 1$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 5 قطع كهربائية غير متميزة ولا نفرق بينها باللمس، منها 3 قطع سليمة وقطعتان غير سليمتين.

نرمز إلى القطعة السليمة بالرمز S وإلى القطعة غير السليمة بالرمز \bar{S}

نسحب عشوائيا من الكيس 3 قطع على التوالي مع الإرجاع، ونعتبر الحوادث:

A : "القطعة الأولى المسحوبة سليمة"، B : "سحب قطعة واحدة فقط سليمة"

C : "القطعة الثالثة المسحوبة سليمة"

(1) شكّل شجرة الاحتمالات التي تُتمذج هذه التجربة.

(2) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ احتمالي الحادثتين A و B ثم بيّن أن: $P(C) = \frac{3}{5}$

(3) احسب الاحتمال الشرطي $P_C(A)$ ، هل الحادثتان A و C مستقلتان؟

(4) نُرفق بكل قطعة سليمة العدد 10 وبكل قطعة غير سليمة العدد -10، ونعتبر X المتغير العشوائي الذي

يرفق بكل عملية سحب من الكيس لثلاث قطع مجموع الأعداد المرفقة بها.

(أ) بَرّر أن قيم المتغير العشوائي X هي: -30، -10، 10، 30

(ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير في كل حالة مما يلي:

(1) z عدد مركب مرافقه \bar{z} ، مرافق العدد المركب $z+i$ هو:

(أ) $\bar{z}-i$ (ب) $\bar{z}+i$ (ج) $z-i$

(2) العدد المركب $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2024}$ يساوي: (أ) 1 (ب) i (ج) -1

(3) z عدد مركب حيث $z=2(1+i\sqrt{3})$

من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، نضع: $S_n = \ln|z| + \ln|z|^2 + \dots + \ln|z|^n$ ، لدينا:

(أ) $S_n = (n+1)^2 \ln 2$ (ب) $S_n = n(n+1) \ln 2$ (ج) $S_n = 2 \left(\frac{1-(2 \ln 2)^n}{1-2 \ln 2} \right) \ln 2$

(4) z عدد مركب حيث: $z = \sin \frac{\pi}{8} + i \cos \frac{\pi}{8}$ ، الشكل المثلثي للعدد المركب z هو:

(أ) $-\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ (ب) $\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ (ج) $\cos \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[2; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{x+1}{2x}$

- شكّل جدول تغيرات الدالة f ثم استنتج أنه من أجل كل x من $[2; +\infty[$ فإن $\frac{1}{2} < f(x) \leq \frac{3}{4}$

$$(2) (u_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي } n, n \geq 2 : u_n = \frac{n}{2^n}$$

$$(أ) \text{ بين أنه: من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N}, n \geq 2 \text{ فإن } \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$$


$$(ب) \text{ أثبت أنه: من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N}, n \geq 2 \text{ فإن } u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} \text{ ثم استنتج } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

$$(ج) \text{ نضع من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N}, n \geq 2 : S_n = \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_n}{n}$$

$$- \text{ بين أن: } S_n = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) \text{ ثم عين العدد الطبيعي } n \text{ حتى يكون } S_n = \frac{511}{1024}$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) g الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2} - \ln x$ ، تمثيلها البياني كما في الشكل.



- بقراءة بيانية، عين إشارة $g(x)$

(II) f الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ ب: $f(x) = -x - \frac{\ln x}{x^2}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد

والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (وحدة الطول 2cm).

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) (أ) بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن $f'(x) = \frac{-2g(x)}{x^3}$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ج) أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,7 < \alpha < 0,71$

(3) (أ) بين أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ)

(4) بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه -1، يطلب تعيين معادلة له.

(5) (أ) ارسم كلاً من (Δ)، (T) و (C_f)

(ب) m وسيط حقيقي، عين بياناً قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة: $\frac{\ln x}{x^2} = m$ حلين مختلفين.

(6) (أ) أثبت أن الدالة $H: x \mapsto \frac{-1 - \ln x}{x}$ هي دالة أصلية للدالة $h: x \mapsto \frac{\ln x}{x^2}$ على $]0; +\infty[$

(ب) $\mathcal{A}(\alpha)$ المساحة بالسنتيمتر المربع للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) والمستقيمت

التي معادلاتها: $y = -x$ ، $x = \alpha$ ، $x = 1$

- بين أن: $\mathcal{A}(\alpha) = 4\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha} + 1\right)$