

- I. دالة معرفة على  $IR$  بالعلاقة  $g(x) = x^3 - x$
- ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$
  - حل في  $IR$  المعادلة  $g(x) = 0$  ثم استنتج إشارة  $g$
- II. دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على  $IR$  بالعلاقة  $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 2$ .  $(C_f)$  تمثيلها البياني في مستوي منسوب الى معلم متعامد و متجانس  $(O; I; J)$
- ادرس شفعية الدالة  $f$
  - احسب  $f'(x)$  ثم بين ان إشارة  $f'(x)$  من إشارة  $g(x)$
  - استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها
  - اكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة ذات الفاصلة 0
  - بين ان  $(C_f)$  يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين احداثيتهما
  - اوجد نقط تقاطع  $(C_f)$  مع محوري الاحداثيات
  - أنشئ  $(C_f)$
  - اشرح كيفية انشاء منحنى الدالة  $h(x) = f(|x|)$  المعرفة على  $IR$

بالتوفيق

- I. دالة معرفة على  $IR$  بالعلاقة  $g(x) = x^3 - x$
- ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$
  - حل في  $IR$  المعادلة  $g(x) = 0$  ثم استنتج إشارة  $g$
- II. دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على  $IR$  بالعلاقة  $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 2$ .  $(C_f)$  تمثيلها البياني في مستوي منسوب الى معلم متعامد و متجانس  $(O; I; J)$
- ادرس شفعية الدالة  $f$
  - احسب  $f'(x)$  ثم بين ان إشارة  $f'(x)$  من إشارة  $g(x)$
  - استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها
  - اكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة ذات الفاصلة 0
  - بين ان  $(C_f)$  يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين احداثيتهما
  - اوجد نقط تقاطع  $(C_f)$  مع محوري الاحداثيات
  - أنشئ  $(C_f)$
  - اشرح كيفية انشاء منحنى الدالة  $h(x) = f(|x|)$  المعرفة على  $IR$

بالتوفيق